

There are no translations available.

Studii clinice



Administrarea în continuu, fără întrerupere de Avemar complementar cu oncoterapia clinică (intervenții chirurgicale, radio- și chemoterapia) poate inhiba progresia în toate stadiile bolilor tumorale, efectul de inhibare a metastazelor a fost dovedit și prin studii clinice. Ea poate fi administrat simultan, respectiv în pauzele tratamentului oncoterapeutic, dar și după sistarea oncoterapiei pe baza cunoștințelor noastre timp nelimitat. Conform indicațiilor aprobate de autorități, Avemar este administrat atât în multe tipuri de tumori solide, cât și în terapia adjuvantă a bolilor sistemului hematopoetic. S-au efectuat studii clinice controlate în anumite boli, rezultatele cărora au ajutat la elucidarea rolului Avemar-lui în strategia tratamentului bolilor maligne. Pe lângă rolul de inhibitor tumoral, aplicabilitatea produsului în siguranță este dovedit pe baza studiilor clinice efectuate timp de 6 ani. Îmbunătățirea calității vieții a fost de asemenea dovedit în toate studiile. Iar în unele cazuri avansate de boală, unde tratamentul oncoterapeutic activ nu s-a mai putut lua în considerare, administrarea de Avemar a produs nu numai îmbunătățirea calității de viață, dar și-a dovedit eficiența în reducerea semnificativă a progresării în continuare a bolii.


Cancer colorectal

Administrarea Avemar complementar terapiei oncologice active este indicat în oricare stadiu al bolii. De la stadiul clinic Dukes B2 în sus, administrarea Avemar timp îndelungat face parte lege artis din terapia cancerului colorectal. De asemenea, este de menționat faptul că la pacienții cu metastaze la distanță, complementar cu chemoterapia (5-fluorouracil, scheme terapeutice pe bază de irinotecan sau oxaliplatin) respectiv după terminarea acestora, administrarea Avemar în continuare prelungește semnificativ supraviețuirea.

Melanoma malignum

Cunoscând prognosticul prost și dificultățile tratamentului în stadiile avansate a bolii, poate fi considerat rezultat semnificativ faptul că Avemar –complementar cu oncoterapia activă- poate opri progresia bolii în stadiul III, când tumoarea este în stadiu avansat și există deja metastaze în ganglionii limfatici învecinați. Într-un studiu clinic, pe lângă tratamentul cu DTIC- administrat timp de 6 luni, complementar s-a început tratament cu Avemar timp de 1 an, numărul metastazelor a fost mai scăzut decât în cazurile unde s-a administrat numai DTIC.

Tumori ai cavității bucale



Administrarea complementară de Avemar a crescut semnificativ eficiența tratamentului

citostatic, astfel încât s-a îmbunătățit calitatea vieții respectiv capacitatea nutritivă a bolnavului. Pe lângă tumorile cavității bucale, cu Avemar pot fi tratate eficient și tumorile maligne a pancreasului, a faringelui și laringelui.

Sepsis

Una dintre cele mai severe complicații a tratamentului cu citostatice- greu tratabil cu antibiotice și factori stimulatori de colonie- este neutropenia febrilă și urmarea ei sepsișul complicații care amenință în special copii cu tumori maligne solide sub tratament cu doză subletală- astfel fiind eficient - chemoterapeutică. În cazul în care tratamentul sus amintit se completează cu Avemar, aceste complicații foarte severe apar mult mai rar, astfel se poate continua tratamentul citostatic prescris și șansele de vindecare cresc.

Rezultate în urma tratamentului în alte boli tumorale

Dintre tumorile urologie, în cancerul vezicii urinare pe lângă tratamentul citostatic, respectiv în carcinomul renal cu celule clare completarea tratamentului citostatic și imunoterapeutic cu terapie de susținere cu Avemar s-a observat creșterea efectului de inhibare a progresiei tumorii. În cancerul de prostată s-a observat inhibarea creșterii metastazelor respectiv în câteva cazuri de rezistență la terapie hormonală s-a demonstrat regresare semnificativă prin metode imagistice.

În carcinom hepatocelular stadiu avansat s-a putut demonstra regresare, iar în cazuri operabile după rezecția tumorii primare s-a reușit întârzierea dezvoltării recidivei prin administrare continuă de Avemar.

În cancer de sân, rata regresării metastazelor osoase a crescut în urma tratamentului cu Avemar față de terapia clasică. Cu această afirmație corelează faptul că Avemar are efect sinergistic și potențează activitatea tamoxifenului și a substanțelor SERM.

La pacienți cu cancer pulmonar fără celule mici pentru care tratamentul oncoterapeutic activ a fost nepotrivit, numai prin administrare de Avemar s-a reușit regresare confirmat prin metode imagistice.

Cu toate că urmărirea bolnavilor cu tratament Avemar este posibil doar în câteva cazuri, printre cazurile cu rezultate bune se include și cancer ovarian, gastric, tiroidian adenopapilar, limfom non-Hodgkin și mieloma multiplex. Astfel putem deduce faptul că posibilitățile terapeutice cu Avemar sunt mult mai mari decât ce s-au dovedit până acum prin studii clinice.

<http://www.mskcc.org/mskcc/html/69418.cfm>