

There are no translations available.

Interacțiuni medicamentoase

. Citostatice



Pe baza cunoștințelor actuale, Avemar poate fi administrat cu siguranță deodată cu toate citostaticele folosite uzual în clinică. În urma cercetărilor de interacțiune in vitro și in vivo, la administrarea combinațiilor Avemar-citostatice, nu scade efectul medicamentului citostatic. Este de așteptat faptul că Avemar potențează efectul citostaticului administrat împreună, totodată scade efectele secundare ale citostaticelor – mai ales cele hematopoetice. Cu administrare simultană de Avemar în multe cazuri pot fi prevenite scăderea dozelor de citostatice apărute în urma toxicității acestora.

Antiestrogenice

Avemar poate fi administrat în siguranță cu toate produsele antiestrogenice complementar, în tratamentul cancerului de sân. În urma cercetărilor in vivo și in vitro efectuate, Avemar are efect de potențare în combinație cu tamoxifen și substanțele modulatori ai receptorilor estrogenici selectivi (SERM).

. Citokine

Avemar poate fi administrat în siguranță cu toate citokinele uzuale, folosite în terapie. Efectul antineutropenic al combinațiilor Avemar-citokine este sigur mai bună decât a citokinelor în sine.

. Imatinib mesylate

Pe baza cercetărilor clinice, în leucemie mieloidă cronică administrarea Avemar simultan cu Imatinib mesylate are efect de synergism. Au observat de asemenea că, Avemar suspendă rezistența la imatinib și astfel imatinib poate fi administrat fără întrerupere.

. **Vitamina C**

În unele experimente cu animale, vitamina C administrat simultan cu Avemar a condus la scăderea efectului Avemar-lui. Deoarece vitamina C este recomandat la mulți pacienți cu tumori maligne, între administrarea vitaminei C respectiv Avemar este necesar o pauză de 2 ore.

. **Interacțiuni ne-farmacologice**

. **Radioterapia**

Avemar poate fi administrat în continuu, fără întrerupere în timpul radioterapiei la bolnavii cu tumori. Avemar nu influențează eficiența radioterapiei, în schimb scade efectele secundare hematopoetice.

. **Intervenții chirurgicale**

Avemar poate fi administrat înaintea intervenției- ca neoadjuvant- respectiv după intervenția chirurgicală fără întrerupere. În urma intervenției chirurgicale, tratamentul cu Avemar poate fi început cel puțin la 4 zile, după ce nutriția pacientului și-a reluat calea normală. Administrarea produsului Avemar înainte și după intervenție chirurgicală intervine în prevenția sau întârzierea progresării tumorii, dar se poate aștepta și la diminuarea complicațiilor intervenției (de ex. Infecții) respectiv reabilitarea mai rapidă a pacientului.